

# ¿QUÉ ES EL CMV?

**EL CITOMEGALOVIRUS (CMV) ES UN VIRUS COMÚN QUE PUEDEN CONTAGIARSE PERSONAS DE TODAS LAS EDADES.**

El CMV es la causa más común de pérdida congénita no hereditaria de la audición. Una madre embarazada que tiene CMV puede transmitirle la infección a su bebé por nacer, lo cual puede causarle daños al cerebro, la visión y/o la audición del niño. Según la National CMV Foundation (Fundación Nacional del CMV), uno de cada 150 niños en los Estados Unidos nacen con CMV, y uno de cada cinco niños nacidos con CMV desarrollarán problemas permanentes como pérdida de la audición o retraso mental.

La mayoría de las infecciones con CMV no presentan signos, síntomas o efectos secundarios. No obstante, el CMV puede causar pérdida de la audición en uno o ambos oídos; puede causar diversos grados de pérdida de la audición; y puede causar pérdida de la audición desde el nacimiento o más adelante en el transcurso de la vida. Los niños nacidos con CMV deben hacer pruebas de diagnóstico periódicas para identificar la posible pérdida de la audición hasta la edad de 5 años.

**SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDICIÓN O DE CITOMEGALOVIRUS (CMV) DE SU RECIÉN NACIDO, COMUNÍQUESE CON LA DIVISIÓN DE EXÁMENES Y GENÉTICA DEL RECIÉN NACIDO LLAMANDO AL 717-783-8143.**



**PA DEPARTMENT OF HEALTH**  
625 Forster Street  
Health and Welfare Building  
7th Floor East  
Harrisburg, PA 17120

**PA DEPARTMENT OF HEALTH  
(DEPARTAMENTO DE SALUD DE PA)  
CITOMEGALOVIRUS (CMV)  
INFORMACIÓN PARA PADRES**

# EL CMV Y LA AUDICIÓN DE SU HIJO

**SI SU BEBÉ NO PASÓ LA PRUEBA INICIAL DE LA AUDICIÓN, DEBE HABLAR CON SU PEDIATRA SOBRE LAS PRUEBAS DE CMV ANTES DE SER DADOS DE ALTA DEL HOSPITAL.**

Si el parto tiene lugar en su hogar, en una sala de partos o en cualquier otra circunstancia donde no se efectúe la prueba inicial de la audición en un hospital, debe comunicarse con el pediatra de su bebé lo antes posible para hablar sobre las pruebas de CMV.

La prueba de CMV debe efectuarse dentro de los 21 días posteriores al nacimiento.

El CMV puede diagnosticarse analizando la saliva o la orina de su bebé.

Los bebés diagnosticados con CMV y que reciben un tratamiento temprano pueden tener mejores resultados de la salud.



## CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE LA AUDICIÓN Y DE CMV

- Las pruebas de la audición deben efectuarse entre las primeras 24 y 48 horas de vida.
- **Los bebés que no pasan la prueba inicial de la audición, deben hacer una prueba de CMV dentro de los 21 días posteriores a su nacimiento.**
- Luego, debe efectuarse una prueba ambulatoria de la audición dentro de **1 mes** del nacimiento para los bebés que no pasaron la prueba previa de la audición.
- También debe efectuarse una evaluación de diagnóstico dentro de los **3 meses** del nacimiento para los bebés que no pasaron la última prueba.
- Comuníquese con su pediatra para que lo conecte con un audiólogo pediátrico.